

臺大癌醫 核子醫學部腎上腺皮質掃描 注意事項說明書

檢查地點	B1 核子醫學部 (請詳見背面簡要圖示)	聯絡電話	(02) 23220322 轉 37937
------	-------------------------	------	--------------------------

一 般 注 意 事 項

- ★須帶文件：IC 健保卡、檢查通知單。如有需要，可請家屬協同陪檢。
- ★請依預約檢查時間到檢查地點辦理報到靜脈注射與候檢，若是超過應報到時間15分鐘以上，視當日檢查情況另做安排。
- ★如需更改檢查時間，或對檢查流程有疑問，請於預約檢查日之前七個工作日與本單位聯絡。
聯絡時間：週一到週五上午八點半至下午四點半
聯絡電話：02-23220322 轉分機 37937 核子醫學部。
- ★如對說明書之內容有不明瞭之處，請洽詢診間或門診藥局。

特 殊 注 意 事 項

一、造影檢查前注意事項：

1. 本檢查於靜脈注射同位素藥物，含有少量輻射，若您懷孕或可能懷孕時，可能不宜接受本檢查，請事先告知櫃台與醫護人員。
2. 受檢者於**注射當日**需**禁食至少 8 小時**，可喝白開水，其他生活作息如常。
3. 注射前三天需開始服用 Lugol's Solution (深棕色澄清藥水)與類固醇 Dorison，一直到造影檢查結束為止，共 8 天。
4. 請於注射後第三天睡前服用一次軟便劑 Dulcolax 兩顆。
5. 靜脈注射藥物後需等待藥物吸收，至注射後第 4 天進行造影檢查，請務必準時候檢。
6. 為避免影響檢查結果，掃描前需將身上之外來金屬物移除。
7. 檢查時間大約為 1.5 小時，過程中請勿亂動，如無法靜躺者或幽閉恐懼症者，請事先告知醫護人員。

二、造影檢查後注意事項：

1. 靜脈注射藥物後一星期應避免與孕婦、嬰幼兒長時間近距離接觸。造影檢查後多喝水多排尿，以加速輻射劑量排出。
2. 本注射同位素藥物可由乳汁分泌，若有哺乳之婦女，應於注射後停止哺乳三周。
3. 本檢查書面報告約七個工作天完成，請自行約掛門診或依原預約門診時間看檢查結果。

三、其他注意事項：若遇特殊事件(如颱風停班)，隔日可以電話聯絡核子醫學部改期。

(請翻閱背面)

資料來源 核子醫學部	繪圖	說明書修訂日期 年月日
---------------	----	----------------

臺大癌醫核子醫學部腎上腺皮質掃描注意事項說明書

用藥注意事項

★造影檢查用藥注意事項：

1. 注射日當天，糖尿病患者請勿服用降血糖藥物或注射胰島素。
2. 檢查安排說明：

項目	前三天	前二天	前一天	第0天 注射日	第一天	第二天	第三天	第四天 檢查日
日期	/	/	/	/	/	/	/	/
到癌醫報到 (地點：B1 核子醫學部)				時間：16:00				時間：
須空腹滿8小時				當天早上 8:00 後禁食 (可喝白開水)				
服用 Lugol's solution (保護甲狀腺) 每天3次 大人：每次 3 c.c 小孩：每次 1-2 c.c	★	★	★	★	★	★	★	★
服用 Dorison 每天2次 每次1顆	★	★	★	★	★	★	★	★
服用 Dulcolax 睡前2顆							★	

★臺大癌醫核子醫學部地點簡要圖示



請由一樓希望光塔樓梯或一樓訪客電梯
至 B1 核子醫學部報到櫃台